

Tumore dell'ovaio (ICD-10 = C56)

Ovary cancer

Nel periodo 1998-2002 il tumore dell'ovaio è risultato al 9° posto fra i tumori più frequentemente diagnosticati nel sesso femminile, rappresentando il 2,9% del totale delle diagnosi tumorali; in termini di mortalità ha rappresentato l'ottava causa tumorale con il 4,5% dei decessi neoplastici.

Nell'area AIRT sono stati diagnosticati in media ogni anno 17,9 casi di tumore dell'ovaio ogni 100.000 donne.

Le stime per l'Italia indicano un totale di 4.797 nuovi casi diagnosticati ogni anno nel nostro paese, mentre per quanto riguarda la

mortalità nel 2002 si sono verificati 2.861 decessi per tumore dell'ovaio.

Il rischio di avere una diagnosi di tumore dell'ovaio nel corso della vita (fra 0 e 74 anni) è di 10,4‰ (1 caso ogni 97 donne), mentre il rischio di morire è di 5,4‰.


I tassi di incidenza sono abbastanza omogenei tra le varie aree italiane variando fra 10 e 20 casi per 100.000 donne/anno.

L'incidenza è sostanzialmente stabile nel tempo mentre la mortalità è in lieve riduzione.



During 1998-2002, ovary cancer ranked 9th among the most frequently diagnosed among females, representing 2.9% of all the cancer diagnoses; as regards mortality, it represented 2.9% of all cancer deaths among females. In the area of the Italian Network of Cancer Registries, there were, on average, 17.9 new ovary cancers per 100,000 females. It has been estimated that every year there are 4,797 new ovary cancers diagnosed in Italy.

As regards mortality, there were 2,861 deaths due to ovary cancers in 2002. The cumulative risk (0-74 years) of developing a cancer of the ovary was 10.4‰ (1 case every 97 women) while the cumulative risk of dying from this cancer was 5.4‰. Incidence rates are quite homogeneous across Italy varying between 10 and 20 cases per 100,000 women/year. Incidence is stable over time, while mortality rates show a slightly decreasing trend.

♀ Femmine Females




♀ **Femmine** Females



Basis of diagnosis	Modalità di diagnosi	n. cases	%
histology	istologica	3,914	77%
cytology	citologica	390	8%
clinical	clinica	740	15%
DCO	solo certificato di morte	57	1%
		5,101	

More frequent morphologies among histologically verified cases
 Morfologie più frequenti tra i casi con conferma istologica

8460	Papillary serous cystadenocarcinoma Cistadenocarcinoma sieroso papillare	703	18%
8140	Adenocarcinoma Adenocarcinoma	594	15%
8441	Serous cystadenocarcinoma, NOS Cistadenocarcinoma sieroso, NAS	475	12%
8380	Endometrioid carcinoma, NOS Carcinoma endometriale NAS	345	9%
8000	Tumour, malignant NOS Tumore maligno, NAS	329	8%



→ Ulteriori dati sono disponibili presso: www.registri-tumori.it/incidenza1998-2002/gruppi.html