




## Tumore dell'ipofaringe (ICD-10 C12-13)

Hypopharynx cancer



POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA, 1 GENNAIO 2006

58 751 711

PERSONE CON TUMORE  
2 243 953

PERSONE CON TUMORE  
DELL'IPOFARINGE  
2 521

Complete prevalence by sex, age and years since diagnosis  
Pool of Cancer Registries, 01.01.2006 (proportion per 100 000)

Years since diagnosis	Age class				
	0-44	45-59	60-74	75+	All ages
<b>♂ MALE</b>					
≤ 2 years	0	5	8	7	3
≤ 5 years	0	9	14	12	5
≤ 10 years	0	14	24	20	8
≤ 15 years	0	14	27	21	9
≤ 20 years	0	14	29	23	9
<b>Complete</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>10</b>
(95%CI)	(0 - 0)	(13 - 16)	(27 - 33)	(22 - 30)	(9 - 10)
<b>♀ FEMALE</b>					
≤ 2 years	0	1	1	1	1
≤ 5 years	0	1	2	1	1
≤ 10 years	0	2	3	2	1
≤ 15 years	0	2	4	3	1
≤ 20 years	0	2	4	3	2
<b>Complete</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
(95%CI)	(0 - 0)	(2 - 3)	(3 - 6)	(2 - 4)	(1 - 2)
<b>♂ ♀ MALE &amp; FEMALE</b>					
≤ 2 years	0	3	4	3	2
≤ 5 years	0	5	8	5	3
≤ 10 years	0	7	13	7	4
≤ 15 years	0	8	14	9	5
≤ 20 years	0	8	16	10	5
<b>Complete</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
(95%CI)	(0 - 0)	(7 - 9)	(15 - 18)	(10 - 13)	(5 - 6)

Complete prevalence by sex, age and macro-area  
01.01.2006 (proportion per 100 000)

Macro-area	Age class				
	0-44	45-59	60-74	75+	All ages
<b>♂ MALE</b>					
North West	0	17	32	27	11
North East	0	21	42	37	14
Centre	0	4	16	14	5
South	0	4	11	8	3
<b>♀ FEMALE</b>					
North West	0	2	8	4	3
North East	0	4	4	3	2
Centre	0	2	3	4	1
South	0	0	0	2	0
<b>♂ ♀ MALE &amp; FEMALE</b>					
North West	0	9	19	12	7
North East	0	12	22	15	8
Centre	0	3	9	8	3
South	0	2	5	4	2


PERSONE CON TUMORE  
**2 243 953**

PERSONE CON TUMORE  
DELL'IPOFARINGE  
**2521**

### Prevalenza, Italia 1 gennaio 2006

**2 521** persone hanno avuto una diagnosi di **tumore dell'ipofaringe** nel corso della vita.

Di queste	<b>702</b>	■ l'hanno avuta da meno di 2 anni	(28%)
	<b>562</b>	■ da 2-5 anni	(22%)
	<b>749</b>	■ da 5-10 anni	(30%)
	<b>220</b>	■ da 10-15 anni	(9%)
	<b>165</b>	■ da 15-20 anni	(7%)
	<b>122</b>	■ l'hanno avuta da più di 20 anni	(5%)



**83%**

**17%**

Number of total prevalent subjects			Macro-area Cancer Registry (CR)	Complete prevalence by years since diagnosis, CRs and macro-area, M&F 01.01.2006 (proportion per 100 000)					
M	F	M&F		YEARS SINCE DIAGNOSIS					
♂	♀	♂♀		≤ 2	2-5	5-10	10-15	15-20	> 20
			<b>North West</b>						
18	3	21	Biella						
26	9	35	Genova						
69	18	87	Milano						
6	8	14	Sondrio						
48	5	53	Torino						
47	10	57	Varese						
			<b>North East</b>						
70	13	83	Alto Adige						
12	1	13	Ferrara						
152	17	169	Friuli V.G.						
12	5	17	Modena						
29	2	31	Parma						
8	0	8	Reggio Emilia						
13	2	15	Romagna						
41	5	46	Trento						
107	17	124	Veneto						
			<b>Centre</b>						
25	11	36	Firenze Prato						
4	2	6	Latina						
29	3	32	Umbria						
			<b>South</b>						
2	0	2	Napoli						
1	1	2	Ragusa						
8	1	9	Salerno						
20	0	20	Sassari						
3	3	6	Siracusa						
			<b>Pool</b>						
750	136	886							
<b>Italy (estimates)</b>									
2 097	424	2 521							