




Tutti i tumori (esclusi i tumori non melanomatosi della cute)
(ICD-10 C00-43, C45-96, D90.9, D30.3, D41.4)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|--------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 101 | 688 | 2 582 | 3 539 | 651 |
| ≤ 5 anni | 213 | 1 347 | 4 984 | 6 932 | 1 275 |
| ≤ 10 anni | 336 | 1 967 | 6 957 | 10 972 | 1 873 |
| ≤ 15 anni | 409 | 2 241 | 7 862 | 13 097 | 2 167 |
| ≤ 20 anni | 457 | 2 400 | 8 381 | 14 369 | 2 342 |
| completa | 523 | 2 637 | 8 904 | 15 584 | 2 542 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 151 | 808 | 1 402 | 1 227 | 501 |
| ≤ 5 anni | 318 | 1 783 | 2 995 | 2 881 | 1 095 |
| ≤ 10 anni | 487 | 2 926 | 4 828 | 5 143 | 1 790 |
| ≤ 15 anni | 576 | 3 514 | 5 912 | 6 646 | 2 188 |
| ≤ 20 anni | 627 | 3 852 | 6 764 | 7 718 | 2 459 |
| completa | 705 | 4 257 | 8 033 | 10 041 | 2 890 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 126 | 749 | 1 969 | 2 094 | 574 |
| ≤ 5 anni | 265 | 1 570 | 3 952 | 4 401 | 1 183 |
| ≤ 10 anni | 411 | 2 459 | 5 852 | 7 330 | 1 830 |
| ≤ 15 anni | 492 | 2 894 | 6 850 | 9 066 | 2 178 |
| ≤ 20 anni | 542 | 3 145 | 7 541 | 10 213 | 2 402 |
| completa | 614 | 3 468 | 8 452 | 12 121 | 2 720 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 1 786 | 1 440 | 3 226 |
| ≤ 5 anni | 3 500 | 3 149 | 6 649 |
| ≤ 10 anni | 5 142 | 5 149 | 10 291 |
| ≤ 15 anni | 5 950 | 6 295 | 12 245 |
| ≤ 20 anni | 6 430 | 7 075 | 13 505 |
| completa | 6 978 | 8 316 | 15 294 |



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Testa e collo (ICD-10 C00-14, C30-32)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 73 | 156 | 64 | 37 |
| ≤ 5 anni | 5 | 125 | 288 | 192 | 69 |
| ≤ 10 anni | 7 | 204 | 480 | 456 | 120 |
| ≤ 15 anni | 9 | 237 | 610 | 616 | 149 |
| ≤ 20 anni | 9 | 249 | 690 | 765 | 168 |
| completa | 10 | 262 | 786 | 1 099 | 195 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 16 | 17 | 16 | 8 |
| ≤ 5 anni | 5 | 35 | 39 | 44 | 17 |
| ≤ 10 anni | 7 | 53 | 81 | 77 | 30 |
| ≤ 15 anni | 10 | 67 | 104 | 103 | 38 |
| ≤ 20 anni | 11 | 74 | 117 | 121 | 43 |
| completa | 13 | 86 | 141 | 172 | 53 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 44 | 84 | 34 | 22 |
| ≤ 5 anni | 5 | 79 | 159 | 99 | 43 |
| ≤ 10 anni | 7 | 126 | 273 | 219 | 74 |
| ≤ 15 anni | 9 | 150 | 347 | 295 | 92 |
| ≤ 20 anni | 10 | 159 | 393 | 363 | 104 |
| completa | 12 | 172 | 451 | 520 | 123 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 102 | 23 | 125 |
| ≤ 5 anni | 190 | 49 | 239 |
| ≤ 10 anni | 329 | 85 | 414 |
| ≤ 15 anni | 409 | 111 | 520 |
| ≤ 20 anni | 460 | 125 | 585 |
| completa | 536 | 153 | 689 |



Stomaco (ICD-10 C16)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 25 | 63 | 91 | 18 |
| ≤ 5 anni | 3 | 46 | 126 | 173 | 33 |
| ≤ 10 anni | 4 | 69 | 180 | 265 | 48 |
| ≤ 15 anni | 5 | 81 | 207 | 359 | 58 |
| ≤ 20 anni | 5 | 88 | 232 | 411 | 65 |
| completa | 5 | 96 | 270 | 517 | 75 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 1 | 16 | 33 | 44 | 10 |
| ≤ 5 anni | 2 | 33 | 50 | 82 | 19 |
| ≤ 10 anni | 3 | 62 | 86 | 115 | 32 |
| ≤ 15 anni | 3 | 73 | 107 | 142 | 38 |
| ≤ 20 anni | 3 | 82 | 123 | 163 | 43 |
| completa | 3 | 91 | 155 | 222 | 53 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 21 | 48 | 62 | 14 |
| ≤ 5 anni | 3 | 39 | 87 | 116 | 26 |
| ≤ 10 anni | 3 | 66 | 131 | 171 | 40 |
| ≤ 15 anni | 4 | 77 | 155 | 223 | 48 |
| ≤ 20 anni | 4 | 85 | 176 | 256 | 54 |
| completa | 4 | 93 | 210 | 333 | 64 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 49 | 30 | 79 |
| ≤ 5 anni | 91 | 54 | 145 |
| ≤ 10 anni | 132 | 91 | 223 |
| ≤ 15 anni | 159 | 110 | 269 |
| ≤ 20 anni | 177 | 125 | 302 |
| completa | 205 | 152 | 357 |



**Colon, retto, ano
(ICD-10 C18-21)**

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 104 | 375 | 538 | 88 |
| ≤ 5 anni | 6 | 196 | 709 | 1 040 | 168 |
| ≤ 10 anni | 9 | 261 | 961 | 1 751 | 242 |
| ≤ 15 anni | 10 | 277 | 1 055 | 2 076 | 270 |
| ≤ 20 anni | 10 | 290 | 1 126 | 2 295 | 290 |
| completa | 10 | 299 | 1 183 | 2 517 | 307 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 5 | 77 | 195 | 230 | 56 |
| ≤ 5 anni | 12 | 150 | 373 | 520 | 116 |
| ≤ 10 anni | 14 | 208 | 562 | 926 | 177 |
| ≤ 15 anni | 15 | 226 | 661 | 1 129 | 207 |
| ≤ 20 anni | 16 | 239 | 728 | 1 284 | 228 |
| completa | 16 | 249 | 790 | 1 504 | 252 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 90 | 282 | 346 | 72 |
| ≤ 5 anni | 9 | 172 | 534 | 715 | 141 |
| ≤ 10 anni | 12 | 234 | 754 | 1 235 | 209 |
| ≤ 15 anni | 12 | 251 | 851 | 1 484 | 237 |
| ≤ 20 anni | 13 | 264 | 919 | 1 663 | 258 |
| completa | 13 | 273 | 979 | 1 884 | 279 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 242 | 162 | 404 |
| ≤ 5 anni | 462 | 333 | 795 |
| ≤ 10 anni | 664 | 510 | 1 174 |
| ≤ 15 anni | 740 | 595 | 1 335 |
| ≤ 20 anni | 796 | 655 | 1 451 |
| completa | 844 | 724 | 1 568 |



**Polmone, bronchi, trachea
(ICD-10 C33-34)**

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 4 | 63 | 282 | 292 | 61 |
| ≤ 5 anni | 5 | 86 | 447 | 456 | 92 |
| ≤ 10 anni | 6 | 121 | 592 | 675 | 125 |
| ≤ 15 anni | 6 | 126 | 666 | 841 | 142 |
| ≤ 20 anni | 7 | 130 | 705 | 921 | 152 |
| completa | 9 | 136 | 745 | 1 041 | 164 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 33 | 58 | 38 | 17 |
| ≤ 5 anni | 3 | 55 | 92 | 49 | 27 |
| ≤ 10 anni | 3 | 71 | 122 | 115 | 38 |
| ≤ 15 anni | 3 | 76 | 133 | 117 | 41 |
| ≤ 20 anni | 3 | 78 | 139 | 125 | 42 |
| completa | 4 | 80 | 145 | 133 | 44 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 48 | 166 | 134 | 38 |
| ≤ 5 anni | 4 | 70 | 263 | 202 | 59 |
| ≤ 10 anni | 5 | 95 | 348 | 325 | 81 |
| ≤ 15 anni | 5 | 100 | 389 | 389 | 90 |
| ≤ 20 anni | 5 | 104 | 411 | 423 | 96 |
| completa | 6 | 107 | 434 | 474 | 102 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 166 | 50 | 216 |
| ≤ 5 anni | 253 | 77 | 330 |
| ≤ 10 anni | 344 | 110 | 454 |
| ≤ 15 anni | 391 | 117 | 508 |
| ≤ 20 anni | 416 | 122 | 538 |
| completa | 449 | 126 | 575 |



Melanoma della pelle (ICD-10 C43)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 6 | 23 | 54 | 27 | 16 |
| ≤ 5 anni | 10 | 44 | 84 | 27 | 26 |
| ≤ 10 anni | 16 | 88 | 120 | 46 | 43 |
| ≤ 15 anni | 18 | 101 | 136 | 85 | 51 |
| ≤ 20 anni | 18 | 112 | 152 | 95 | 55 |
| completa | 19 | 121 | 171 | 107 | 60 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 8 | 16 | 28 | 6 | 12 |
| ≤ 5 anni | 17 | 33 | 64 | 16 | 26 |
| ≤ 10 anni | 26 | 66 | 97 | 38 | 43 |
| ≤ 15 anni | 31 | 89 | 116 | 63 | 55 |
| ≤ 20 anni | 32 | 102 | 138 | 74 | 61 |
| completa | 33 | 116 | 175 | 101 | 71 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 7 | 20 | 40 | 14 | 14 |
| ≤ 5 anni | 13 | 38 | 74 | 21 | 26 |
| ≤ 10 anni | 21 | 77 | 108 | 41 | 43 |
| ≤ 15 anni | 24 | 95 | 126 | 71 | 53 |
| ≤ 20 anni | 25 | 107 | 145 | 82 | 59 |
| completa | 26 | 118 | 173 | 103 | 66 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 43 | 35 | 78 |
| ≤ 5 anni | 71 | 74 | 145 |
| ≤ 10 anni | 119 | 125 | 244 |
| ≤ 15 anni | 139 | 157 | 296 |
| ≤ 20 anni | 152 | 177 | 329 |
| completa | 165 | 203 | 368 |






Mammella femminile (ICD-10 C50)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 53 | 348 | 487 | 449 | 189 |
| ≤ 5 anni | 110 | 839 | 1 118 | 1 013 | 432 |
| ≤ 10 anni | 145 | 1 444 | 1 989 | 1 895 | 734 |
| ≤ 15 anni | 154 | 1 698 | 2 483 | 2 516 | 889 |
| ≤ 20 anni | 155 | 1 796 | 2 896 | 3 027 | 993 |
| completa | 155 | 1 828 | 3 241 | 3 801 | 1 091 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | |
|---|--------------|
| Anni dalla diagnosi | FEMMINE |
| ≤ 2 anni | 543 |
| ≤ 5 anni | 1 243 |
| ≤ 10 anni | 2 112 |
| ≤ 15 anni | 2 558 |
| ≤ 20 anni | 2 856 |
| completa | 3 139 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Cervice uterina (ICD-10 C53)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 4 | 16 | 11 | 11 | 8 |
| ≤ 5 anni | 6 | 44 | 45 | 55 | 21 |
| ≤ 10 anni | 10 | 73 | 89 | 82 | 37 |
| ≤ 15 anni | 11 | 110 | 130 | 112 | 51 |
| ≤ 20 anni | 12 | 135 | 186 | 157 | 66 |
| completa | 12 | 157 | 365 | 620 | 122 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | |
|---|------------|
| Anni dalla diagnosi | FEMMINE |
| ≤ 2 anni | 22 |
| ≤ 5 anni | 61 |
| ≤ 10 anni | 105 |
| ≤ 15 anni | 148 |
| ≤ 20 anni | 190 |
| completa | 352 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Endometrio (ICD-10 C54)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 60 | 114 | 49 | 31 |
| ≤ 5 anni | 4 | 100 | 278 | 142 | 65 |
| ≤ 10 anni | 5 | 133 | 417 | 318 | 100 |
| ≤ 15 anni | 5 | 161 | 518 | 443 | 126 |
| ≤ 20 anni | 5 | 169 | 591 | 570 | 145 |
| completa | 5 | 174 | 656 | 836 | 171 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | |
|---|------------|
| Anni dalla diagnosi | FEMMINE |
| ≤ 2 anni | 88 |
| ≤ 5 anni | 188 |
| ≤ 10 anni | 289 |
| ≤ 15 anni | 364 |
| ≤ 20 anni | 418 |
| completa | 492 |



Supplemento numero 2

Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy


Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144



Prostata (ICD-10 C61)

| Prevalenza per età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 0 | 33 | 631 | 994 | 122 |
| ≤ 5 anni | 0 | 85 | 1 153 | 2 125 | 241 |
| ≤ 10 anni | 0 | 90 | 1 549 | 3 101 | 329 |
| ≤ 15 anni | 0 | 90 | 1 590 | 3 400 | 346 |
| ≤ 20 anni | 0 | 90 | 1 604 | 3 551 | 354 |
| completa | 0 | 90 | 1 606 | 3 585 | 355 |

| Prevalenza per anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | |
|---|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI |
| ≤ 2 anni | 336 |
| ≤ 5 anni | 661 |
| ≤ 10 anni | 903 |
| ≤ 15 anni | 949 |
| ≤ 20 anni | 971 |
| completa | 975 |



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Rene e altri organi urinari (ICD-10 C64-66, C68)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 31 | 51 | 82 | 18 |
| ≤ 5 anni | 7 | 67 | 168 | 182 | 45 |
| ≤ 10 anni | 10 | 106 | 237 | 237 | 65 |
| ≤ 15 anni | 12 | 123 | 281 | 331 | 78 |
| ≤ 20 anni | 13 | 131 | 306 | 374 | 85 |
| completa | 16 | 138 | 329 | 424 | 93 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 24 | 25 | 16 | 10 |
| ≤ 5 anni | 3 | 49 | 64 | 71 | 24 |
| ≤ 10 anni | 6 | 69 | 111 | 192 | 43 |
| ≤ 15 anni | 9 | 88 | 138 | 278 | 57 |
| ≤ 20 anni | 13 | 96 | 152 | 315 | 66 |
| completa | 22 | 115 | 174 | 370 | 81 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 27 | 38 | 41 | 14 |
| ≤ 5 anni | 5 | 58 | 114 | 113 | 34 |
| ≤ 10 anni | 8 | 87 | 172 | 209 | 54 |
| ≤ 15 anni | 10 | 105 | 206 | 298 | 67 |
| ≤ 20 anni | 13 | 113 | 226 | 337 | 75 |
| completa | 19 | 126 | 249 | 390 | 87 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 48 | 30 | 78 |
| ≤ 5 anni | 123 | 69 | 192 |
| ≤ 10 anni | 178 | 124 | 302 |
| ≤ 15 anni | 214 | 164 | 378 |
| ≤ 20 anni | 234 | 189 | 423 |
| completa | 257 | 233 | 490 |




Vescica

(ICD-10 C67, D09.0, D30.3, D41.4)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 9 | 138 | 456 | 857 | 122 |
| ≤ 5 anni | 15 | 269 | 1 090 | 1 852 | 267 |
| ≤ 10 anni | 23 | 382 | 1 642 | 3 256 | 417 |
| ≤ 15 anni | 26 | 431 | 1 981 | 4 100 | 503 |
| ≤ 20 anni | 27 | 459 | 2 152 | 4 631 | 551 |
| completa | 29 | 483 | 2 314 | 5 259 | 601 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 2 | 53 | 78 | 49 | 24 |
| ≤ 5 anni | 5 | 77 | 142 | 203 | 48 |
| ≤ 10 anni | 9 | 104 | 234 | 394 | 80 |
| ≤ 15 anni | 11 | 118 | 260 | 550 | 97 |
| ≤ 20 anni | 12 | 128 | 282 | 619 | 106 |
| completa | 13 | 141 | 309 | 708 | 118 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 5 | 95 | 260 | 353 | 72 |
| ≤ 5 anni | 10 | 170 | 598 | 821 | 155 |
| ≤ 10 anni | 16 | 239 | 911 | 1 468 | 244 |
| ≤ 15 anni | 18 | 270 | 1 087 | 1 882 | 295 |
| ≤ 20 anni | 20 | 289 | 1 182 | 2 124 | 323 |
| completa | 21 | 308 | 1 273 | 2 415 | 354 |


| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 334 | 69 | 403 |
| ≤ 5 anni | 733 | 139 | 872 |
| ≤ 10 anni | 1 144 | 229 | 1 373 |
| ≤ 15 anni | 1 380 | 278 | 1 658 |
| ≤ 20 anni | 1 512 | 306 | 1 818 |
| completa | 1 650 | 341 | 1 991 |



Tiroide (ICD-10 C73)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 11 | 15 | 24 | 0 | 13 |
| ≤ 5 anni | 22 | 58 | 54 | 9 | 32 |
| ≤ 10 anni | 34 | 92 | 96 | 9 | 52 |
| ≤ 15 anni | 38 | 109 | 117 | 28 | 61 |
| ≤ 20 anni | 40 | 120 | 130 | 32 | 66 |
| completa | 41 | 130 | 143 | 36 | 70 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 35 | 42 | 58 | 6 | 38 |
| ≤ 5 anni | 73 | 111 | 122 | 33 | 84 |
| ≤ 10 anni | 113 | 224 | 209 | 66 | 143 |
| ≤ 15 anni | 133 | 295 | 268 | 98 | 178 |
| ≤ 20 anni | 140 | 325 | 301 | 116 | 194 |
| completa | 143 | 352 | 345 | 142 | 208 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 23 | 29 | 42 | 3 | 25 |
| ≤ 5 anni | 48 | 85 | 90 | 24 | 59 |
| ≤ 10 anni | 73 | 160 | 155 | 45 | 98 |
| ≤ 15 anni | 85 | 204 | 195 | 72 | 121 |
| ≤ 20 anni | 90 | 225 | 219 | 84 | 131 |
| completa | 92 | 244 | 248 | 102 | 141 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 35 | 108 | 143 |
| ≤ 5 anni | 89 | 241 | 330 |
| ≤ 10 anni | 142 | 411 | 553 |
| ≤ 15 anni | 166 | 513 | 679 |
| ≤ 20 anni | 180 | 557 | 737 |
| completa | 192 | 598 | 790 |






Linfoma di Hodgkin (ICD-O-3 M9650-M9667)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| ≤ 5 anni | 20 | 19 | 18 | 9 | 19 |
| ≤ 10 anni | 29 | 35 | 30 | 27 | 30 |
| ≤ 15 anni | 35 | 52 | 45 | 39 | 40 |
| ≤ 20 anni | 40 | 71 | 58 | 52 | 48 |
| completa | 44 | 133 | 160 | 191 | 81 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| ≤ 5 anni | 22 | 13 | 8 | 6 | 17 |
| ≤ 10 anni | 36 | 29 | 11 | 6 | 30 |
| ≤ 15 anni | 48 | 38 | 21 | 12 | 40 |
| ≤ 20 anni | 54 | 53 | 28 | 14 | 48 |
| completa | 59 | 103 | 67 | 31 | 67 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| ≤ 5 anni | 21 | 16 | 13 | 7 | 18 |
| ≤ 10 anni | 33 | 32 | 20 | 14 | 30 |
| ≤ 15 anni | 41 | 45 | 32 | 22 | 40 |
| ≤ 20 anni | 47 | 62 | 42 | 28 | 48 |
| completa | 52 | 118 | 112 | 91 | 74 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 17 | 15 | 32 |
| ≤ 5 anni | 52 | 50 | 102 |
| ≤ 10 anni | 83 | 86 | 169 |
| ≤ 15 anni | 108 | 115 | 223 |
| ≤ 20 anni | 133 | 139 | 272 |
| completa | 221 | 192 | 413 |



Supplemento numero 2


Prevalenza e guarigione da tumore in Italia /Prevalence and cure of cancer in Italy

Epidemiol Prev 2014; 38(6) suppl 1: 1-144

Linfoma non-Hodgkin (ICD-10 C82-85, C96)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 12 | 50 | 75 | 109 | 31 |
| ≤ 5 anni | 26 | 90 | 144 | 164 | 58 |
| ≤ 10 anni | 44 | 144 | 228 | 328 | 97 |
| ≤ 15 anni | 56 | 166 | 274 | 413 | 117 |
| ≤ 20 anni | 62 | 185 | 301 | 452 | 130 |
| completa | 71 | 214 | 336 | 498 | 147 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 3 | 20 | 64 | 66 | 18 |
| ≤ 5 anni | 11 | 57 | 131 | 186 | 46 |
| ≤ 10 anni | 24 | 106 | 220 | 290 | 81 |
| ≤ 15 anni | 31 | 132 | 258 | 322 | 97 |
| ≤ 20 anni | 35 | 148 | 285 | 356 | 108 |
| completa | 40 | 175 | 327 | 400 | 124 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 8 | 35 | 69 | 82 | 24 |
| ≤ 5 anni | 18 | 73 | 137 | 178 | 52 |
| ≤ 10 anni | 34 | 124 | 224 | 305 | 89 |
| ≤ 15 anni | 43 | 149 | 266 | 356 | 107 |
| ≤ 20 anni | 48 | 166 | 292 | 392 | 119 |
| completa | 55 | 194 | 331 | 437 | 135 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 84 | 52 | 136 |
| ≤ 5 anni | 159 | 131 | 290 |
| ≤ 10 anni | 266 | 232 | 498 |
| ≤ 15 anni | 322 | 279 | 601 |
| ≤ 20 anni | 357 | 311 | 668 |
| completa | 404 | 357 | 761 |



Leucemie (ICD-10 C91-95)

| Prevalenza per sesso, età e anni dalla diagnosi RT di Napoli. 01.01.2010 (proporzione per 100 000) | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-----|--------|
| Anni dalla diagnosi | Classe di età | | | | |
| | 0-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Totale |
| MASCHI | | | | | |
| ≤ 2 anni | 10 | 13 | 39 | 55 | 16 |
| ≤ 5 anni | 20 | 38 | 69 | 82 | 32 |
| ≤ 10 anni | 34 | 62 | 129 | 137 | 55 |
| ≤ 15 anni | 40 | 71 | 142 | 188 | 64 |
| ≤ 20 anni | 48 | 78 | 155 | 208 | 73 |
| completa | 59 | 86 | 164 | 225 | 83 |
| FEMMINE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 9 | 6 | 28 | 11 | 11 |
| ≤ 5 anni | 16 | 27 | 50 | 27 | 23 |
| ≤ 10 anni | 26 | 47 | 97 | 82 | 42 |
| ≤ 15 anni | 35 | 56 | 120 | 108 | 54 |
| ≤ 20 anni | 43 | 63 | 130 | 120 | 63 |
| completa | 63 | 93 | 147 | 129 | 83 |
| TOTALE | | | | | |
| ≤ 2 anni | 9 | 9 | 33 | 27 | 13 |
| ≤ 5 anni | 18 | 33 | 59 | 48 | 28 |
| ≤ 10 anni | 30 | 54 | 113 | 103 | 48 |
| ≤ 15 anni | 37 | 64 | 130 | 138 | 59 |
| ≤ 20 anni | 46 | 70 | 142 | 153 | 68 |
| completa | 61 | 89 | 155 | 165 | 83 |

| Prevalenza per sesso e anni dalla diagnosi (persone) RT di Napoli. 01.01.2010 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Anni dalla diagnosi | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| ≤ 2 anni | 43 | 31 | 74 |
| ≤ 5 anni | 88 | 67 | 155 |
| ≤ 10 anni | 150 | 122 | 272 |
| ≤ 15 anni | 175 | 156 | 331 |
| ≤ 20 anni | 200 | 181 | 381 |
| completa | 228 | 240 | 468 |

