

Numeri

WWW.EPIPREV.IT

Elaborazione a cura di Marine Castaing,¹ Francesca Bella,¹ Carlotta Buzzoni,² AIRTUM Working Group³

¹Registro Tumori Integrato di Catania-Messina-Siracusa-Enna, Università degli Studi di Catania


²Banca dati Airtum c/o UO Epidemiologia clinica e descrittiva, ISPO Firenze

³www.registri-tumori.it

Corrispondenza: marinecastaing@hotmail.com

L'INCIDENZA DEL TUMORE DELLO STOMACO DIMINUISCE PIÙ IN FRETTA AL CENTRO-NORD

Fonte AIRTUM




Il tumore dello stomaco è la neoplasia che ha recentemente mostrato la più forte riduzione in media per entrambi i sessi (-29,7% tra i periodi 1993-1995 e 2003-2005). Tale tumore presenta un gradiente d'incidenza Centro-Nord-Sud caratteristico, con una maggiore incidenza al Centro rispetto al Nord sia nelle donne sia negli uomini. Il grafico mostra che la riduzione al Centro e al Nord è più marcata rispetto al Sud.

- ▲ Uomini Nord - APC: -2.9* (-4.2 ; -1.5)
- Uomini Toscana-EmiliaRomagna-Umbria-Lazio - APC: -4.2* (-5.2 ; -3.2)
- Uomini Sud - APC: -0.4 (-2.6 ; 1.8)
- ▲ Donne Nord - APC: -3.3* (-4.4 ; -2.2)
- Donne Toscana-EmiliaRomagna-Umbria-Lazio - APC: -4.2* (-4.8 ; -3.5)
- Donne Sud - APC: -1 (-3.8 ; 1.8)
- - - Lineare (Donne Sud - APC: -1 (-3.8 ; 1.8))
- - - Lineare (Donne Nord - APC: -3.3* (-4.4 ; -2.2))
- - - Lineare (Donne Toscana-EmiliaRomagna-Umbria-Lazio - APC: -4.2* (-4.8 ; -3.5))

Leggi l'approfondimento: www.epiprev.it/rubriche/numeri-come-notizie/intro

SINTOMI DEPRESSIVI. UNA SFIDA PER LA COMUNITÀ AQUILANA DOPO IL TERREMOTO DEL 2009

Prevalenze di sintomi di umore depresso e perdita di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività (dati rilevati nella Asl de L'Aquila, prima e dopo il terremoto del 6 Aprile 2009)



Nel corso del 2010, a L'Aquila, gli adulti tra 18 e 69 anni positivi al test *Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2)*, che valuta la presenza di sintomi di umore depresso e anedonia (perdita di interesse per tutte o quasi tutte le attività), sono stati circa il 16%, un dato significativamente più elevato di quello corrispondente (10%) rilevato nel 2007-08 nella stessa Asl, in un campione proveniente dalla stessa popolazione. L'elevata prevalenza di sintomi depressivi, rilevata dopo 14 -19 mesi dal terremoto, potrebbe verosimilmente comportare un aumento nella richiesta di assistenza ai servizi di base e specialistici e, allo stesso tempo, limitare le capacità di reazione della popolazione che ha davanti a sé la sfida della ricostruzione.

Leggi l'approfondimento e le note metodologiche e la bibliografia su www.epiprev.it/rubriche/numeri-come-notizie/intro

Autori
Gigantesco A,¹ Mirante N,¹ Minardi V,^{1,4} Tarolla E,¹ Cofini V,² Carbonelli A,² Diodati G,³ Granchelli C,³ Cristiana M,³ D'Argenio P,⁴ Trinito MQ,⁴ Salmaso S¹

¹ Cnesps
² Università de L'Aquila
³ Rete Passi Abruzzo
⁴ Gruppo tecnico Passi
www.epicentro.iss.it/passi