

INCIDENZA MELANOMA DELLA CUTE



Contesto

Sono stimate circa 7.200 nuove diagnosi di melanoma per gli uomini nel 2018 (4% di tutti i tumori), al decimo posto dopo i tumori delle alte vie respiratorie e digestive e dello stomaco.

Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 14 casi ogni 100.000 uomini. I tassi erano in incremento di circa il 3,4% annuo per tutto il periodo di osservazione. Nel 2014 si osservavano 21 casi ogni 100.000 uomini.

Commento


A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza negli uomini è aumentata in modo significativo in tutte le macro-aree, con incrementi più consistenti nelle macro-aree già a maggior incidenza, ed in tutte le classi d'età con lo stesso andamento.


Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente aumentata in tutte le macro-aree, in particolare nel Centro, con un incremento di circa il 6,4% annuo in tutto il periodo, e nel Nord-Est, dove ad un incremento dei tassi di circa il 9,8% annuo sino al 2005 sono seguite una fase di incremento non significativo sino al 2009 ed una successiva crescita di circa il 4,4% annuo nell'ultimo periodo. Nel Nord-Ovest e nel Sud e Isole si sono riscontrati incrementi più contenuti, rispettivamente del 2,9% e 1,7% annuo, con un'ulteriore incremento delle differenze tra aree a maggior e minor incidenza. Si sono riscontrati incrementi d'incidenza significativi e simili in tutte le classi d'età, in particolare negli uomini di età inferiore ai 50 anni del 3,3%, nella classe di età 50-69 del 3,4% e negli uomini con almeno 70 anni del 3,5% annuo. Le differenze tra regioni sono più accentuate che per altre sedi, in entrambi i sessi. Tassi particolarmente elevati sono stati registrati in Alto Adige e Toscana.



	PERIODO		TASSO	APC	95%	95% CI	
Totale	2003	2014	17,3	3,4	3,1	3,7	
00-49	2003	2014	6,9	3,3	2,4	4,2	
50-69	2003	2014	28,1	3,4	2,9	3,9	
70+	2003	2014	43,4	3,5	3,0	4,1	
NORD-OVEST	2003	2014	19,6	2,9	2,5	3,4	
NORD-EST	2003	2005	18,4	9,8	2,2	17,9	
NORD-EST	2005	2009	21,0	2,4	-0,6	5,4	
NORD-EST	2009	2014	24,7	4,4	3,1	5,8	
CENTRO	2003	2014	22,9	6,4	5,4	7,3	
SUD E ISOLE	2003	2014	10,4	1,7	1,3	2,1	







INCIDENZA MELANOMA DELLA CUTE



Contesto

Sono stimate circa 6.500 nuove diagnosi di melanoma per le donne nel 2018 (4% di tutti i tumori), al sesto posto dopo il tumore del pancreas.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 12 casi ogni 100.000 donne. I tassi erano in aumento di circa il 4,7% all'anno nel periodo 2003-2006 all'anno e del 2,0% negli anni successivi sino al 2014. Nel 2014 si osservavano 16 casi ogni 100.000 donne.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nelle donne è aumentata in modo significativo in tutte le macro-aree, con incrementi più consistenti nelle macro-aree già a maggior incidenza, ed in in tutte le classi d'età.


Confronti


Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente aumentata in tutte le macro-aree. L'incremento maggiore si è registrato nel Centro, di circa il 13,1% annuo dal 2003 al 2006 seguito da circa il 2,2% annuo sino al 2014. Nel Nord-Ovest si è registrato un incremento di circa l'1,5%, nel Nord-Est del 3,0% e nel Sud e nelle Isole del 2,6% annuo in tutto il periodo di osservazione, con una ulteriore incremento delle differenze tra aree a maggior e minor incidenza.

Nelle donne di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono significativamente aumentati del 4,3% annuo nel periodo 2003-2009, con un successivo incremento non significativo dello 0,4% annuo fino al 2014. Nella classe di età 50-69 anni e nelle donne con almeno 70 anni si è registrato un aumento significativo dell'incidenza del 2,5% annuo per tutto il periodo. Tassi particolarmente elevati sono stati registrati in Alto Adige e Toscana.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	14,4	2,8	2,0	3,5
	2003	2006	12,9	4,7	1,7	7,8
	2006	2014	0,2	2,0	1,5	2,6
0-49	2003	2009	8,9	4,3	2,5	6,2
0-49	2009	2014	10,2	0,4	-1,5	2,3
50-69	2003	2014	21,2	2,5	2,1	3,0
70+	2003	2014	24,1	2,5	2,0	3,0
NORD-OVEST	2003	2014	16,3	1,5	0,8	2,2
NORD-EST	2003	2014	18,3	3,0	2,2	3,8
CENTRO	2003	2006	15.4	13.1	4.5	22.4
CENTRO	2006	2014	20,3	2,2	0,7	3,8
SUD E ISOLE	2003	2014	9,1	2,6	1,9	3,4







MORTALITÀ MELANOMA DELLA CUTE



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 1.136 decessi per melanoma della cute (ISTAT), pari all' 1% di tutti i tumori, all'undicesimo posto dopo i tumori del rene.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio ed al termine del periodo di osservazione la mortalità era di 4 casi ogni 100.000 uomini. I tassi non subiscono variazioni significative nell'intero periodo.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità negli uomini è rimasta complessivamente stabile anche se si registra un incremento nel Centro.


Confronti


Durante il periodo 2003-2014 la mortalità negli uomini è significativamente aumentata nel Centro di circa il 2,7% annuo mentre nelle restanti macro-aree non si osservano variazioni significative dei tassi nel periodo osservato.

Negli uomini con età inferiore ai 50 anni si registra un decremento significativo di circa il 2,5% annuo in tutto il periodo 2003-2014. Nelle altre classi di età non si registrano variazioni significative dei tassi di mortalità durante il periodo asservato



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	3,8	-0,3	-0,9	0,3
00-49	2003	2014	0,7	-2,5	-3,9	-1,0
50-69	2003	2014	5,2	-0,6	-1,4	0,2
70+	2003	2014	14,8	0,3	-0,7	1,3
NORD-OVEST	2003	2014	4,2	-0,4	-1,3	0,5
NORD-EST	2003	2014	4,1	-0,7	-1,7	0,3
CENTRO	2003	2014	4,1	2,7	0,7	4,7
SUD E ISOLE	2003	2014	3,1	-0,9	-2,1	0,3







MORTALITÀ MELANOMA DELLA CUTE



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 807 decessi per melanoma della cute (ISTAT), pari al 1% di tutti i tumori, all'undicesimo posto dopo i tumori delle alte vie respiratorie e digestive.

Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio ed alla fine del periodo di osservazione la mortalità era di 2 casi ogni 100.000 donne. I tassi non subiscono variazioni significative nell'intero periodo.

Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità nelle donne è rimasta complessivamente stabile anche se si registrano andamenti di segno opposto nel Nord-Ovest, in aumento, e nel Nord-Est, in decremento.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità nelle donne è significativamente aumentata nel Nord-Ovest di circa l'1,1% annuo mentre è diminuita nel Nord-Est del 2,4% annuo per tutto il periodo osservato. Nel Centro e nel Sud e nelle Isole l'andamento è sostanzialmente stazionario nello stesso periodo. In nessuna classe di età si registrano variazioni significative dei tassi di mortalità durante il periodo 2003-2014.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	2,1	-0,3	-1,3	0,7
00-49	2003	2014	0,6	-2,1	-4,9	0,8
50-69	2003	2014	2,7	0,9	-0,5	2,3
70+	2003	2014	7,6	-0,2	-1,4	0,9
NORD-OVEST	2003	2014	2,2	1,1	0,3	1,9
NORD-EST	2003	2014	2,2	-2,4	-4,2	-0,7
CENTRO	2003	2014	2,3	-1,2	-3,3	0,9
SUD E ISOLE	2003	2014	1,8	-0,6	-3,1	2,0

