



INCIDENZA TUMORI DELLA TIROIDE

C73



Contesto

Sono stimate circa 3.800 nuove diagnosi di tumore della tiroide per gli uomini nel 2018 (2% di tutti i tumori), al dodicesimo posto dopo il tumore del pancreas.

Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 7 casi ogni 100.000 uomini. I tassi erano in significativo incremento in tutto il periodo in media del 4,0% all'anno, con andamento bimodale: dal 2003 al 2011, l'incremento annuo è stato di circa il 4,8%, mentre dal 2011 al 2014 di circa l'1,7% annuo, non significativo. Nel 2014 si osservavano 10 casi ogni 100.000 uomini.

Commento



A livello nazionale, dal 2003 al 2014, l'incidenza negli uomini è aumentata in modo significativo in tutte le macro-aree. I fattori responsabili di questo aumento generalizzato andrebbero ulteriormente indagati.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente aumentata in tutte le macro-aree. In particolare, nel Sud e Isole, Centro e Nord-Ovest rispettivamente di circa il 5,0%, 4,2% e 2,8% all'anno. Nel Nord-Est ad un primo periodo d'incremento significativo di circa il 7,6% annuo dal 2003 al 2009 è seguito un periodo di sostanziale stabilità dei tassi. L'andamento è analogo nelle donne. Nel periodo osservato, l'incremento d'incidenza è risultato significativo in tutte le macro-fasce d'età. In particolare, negli uomini di età inferiore ai 50 anni e negli uomini con almeno 70 anni, i tassi sono significativamente aumentati rispettivamente del 3,8% e del 4,4% annuo in tutto il periodo. Nella classe di età 50-69 anni, i tassi hanno mostrato un andamento in due fasi: il primo periodo è stato caratterizzato da un aumento significativo del 5,4% annuo fino al 2011, la seconda fase ha mostrato una sostanziale stabilità dei tassi fino al 2014. Aumenti annui > 10% sono stati osservati in Puglia e Umbria, mentre le regioni a più alta incidenza (Lazio ed Emilia Romagna) mostrano aumenti inferiori rispetto alla media italiana.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	8,4	4,0	3,5	4,5
	2003	2011	7,9	4,8	4,3	5,4
	2011	2014	9,8	1,7	-0,1	3,6
00-49	2003	2014	5,5	3,8	3,2	4,4
50-69	2003	2011	13,5	5,4	4,5	6,2
	2011	2014	16,7	0,8	-2,2	3,9
70+	2003	2014	10,4	4,4	3,0	5,8
NORD-OVEST	2003	2014	7,1	2,8	1,9	3,7
NORD-EST	2003	2009	8,4	7,6	6,0	9,3
NORD-EST	2009	2014	10,5	0,6	-1,1	2,4
CENTRO	2003	2014	9,6	4,2	3,0	5,4
SUD E ISOLE	2003	2014	8,6	5,0	4,6	5,5





INCIDENZA TUMORI DELLA TIROIDE

C73



Contesto

Sono stimate circa 10.400 nuove diagnosi di tumore del tiroide per le donne nel 2018 (6% di tutti i tumori), al quarto posto dopo il tumore del polmone.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 20,0 casi ogni 100.000 donne. I tassi sono in significativo aumento di circa il 2,5% all'anno nell'intero periodo, in particolare dal 2003 al 2009 l'incremento è di circa il 3,4% e successivamente dell'1,4% annuo. Nel 2014 si osservavano 26,5 casi ogni 100.000 donne.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014, l'incidenza nelle donne è aumentata in modo significativo in tutte le macro-aree. I fattori responsabili di questo aumento generalizzato andrebbero ulteriormente indagati.



Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente aumentata in tutte le macro-aree. In particolare Centro, nel Sud e Isole e Nord-Ovest rispettivamente di circa il 4,1%, 2,2% e 2,2% all'anno. Nel Nord-Est ad un primo periodo d'incremento significativo di circa il 5,9% annuo dal 2003 al 2008 è seguito un periodo di sostanziale stabilità dei tassi. L'andamento è analogo negli uomini.

Nel periodo osservato, l'incremento d'incidenza è risultato significativo in tutte le fasce d'età. In particolare, nelle donne di età inferiore ai 50 anni e nelle donne con almeno 70 anni, i tassi sono significativamente aumentati di circa il 2,6% annuo in tutto il periodo. Nella classe di età 50-69 anni, i tassi hanno mostrato un andamento in incremento significativo in due fasi: nel primo periodo fino al 2008 di circa il 3,6% annuo, poi seguito da un incremento dell'1,3% all'anno fino al 2014.



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI		
Totale	2003	2009	22,3	3,4	2,4	4,5
	2009	2014	25,4	1,4	0,1	2,8
	2003	2014	23,6	2,5	1,8	3,2
00-49	2003	2014	19,0	2,6	2,1	3,1
50-69	2003	2008	35,4	3,6	2,3	5,0
50-69	2008	2014	40,3	1,3	0,5	2,2
70+	2003	2014	18,5	2,6	1,8	3,5
NORD-OVEST	2003	2014	19,2	2,2	1,5	2,9
NORD-EST	2003	2008	23,2	5,9	3,6	8,3
NORD-EST	2008	2014	26,8	0,2	-1,2	1,7
CENTRO	2003	2014	25,7	4,1	2,8	5,4
SUD E ISOLE	2003	2014	25,9	2,2	1,7	2,8





MORTALITÀ TUMORI DELLA TIROIDE

C73



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 218 decessi per tumore della tiroide (ISTAT), pari allo 0,2% di tutti i tumori, al dodicesimo posto dopo i melanomi cutanei.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 1,0 caso ogni 100.000 uomini. Si osserva un andamento in diminuzione dell'1,6% annuo, non significativo, nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 0,7 decessi ogni 100.000 uomini.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità negli uomini è diminuita in modo significativo e questo grazie agli andamenti registrati nel Nord-Est e nel Sud e Isole.



Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità negli uomini è diminuita significativamente nel Nord-Est e nel Sud e isole, rispettivamente di circa il 4,0% e 2,6% all'anno. Nel Nord-Ovest e nel Centro l'andamento è sostanzialmente stazionario.

Nella classe di età 50-69 anni, i tassi sono diminuiti significativamente del 4,7% annuo mentre negli uomini con almeno 70 anni la riduzione della mortalità osservata di circa lo 0,9% annuo non è statisticamente significativa. Per la mortalità, le differenze tra regioni sono molto meno marcate rispetto a quelle relative all'incidenza.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	0,9	-1,6	-3,5	0,4
00-49	2003	2014	0,1	NON CALCOLABILE		
50-69	2003	2014	1,2	-4,7	-6,9	-2,5
70+	2003	2014	3,6	-0,9	-3,4	1,7
NORD-OVEST	2003	2014	0,9	0,6	-1,8	3,1
NORD-EST	2003	2014	0,8	-4,0	-7,1	-0,7
CENTRO	2003	2014	1,1	-1,1	-6,7	4,8
SUD E ISOLE	2003	2014	0,8	-2,6	-5,1	0,0





MORTALITÀ TUMORI DELLA TIROIDE

C73



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 331 decessi per carcinoma della tiroide (ISTAT), pari allo 0,4% di tutti i tumori, al dodicesimo posto dopo i melanomi cutanei.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 1,1 casi ogni 100.000 donne. Si osserva una diminuzione significativa dell'1,2% annuo nell'intero periodo. Nel 2014 si osservava 1,0 decesso ogni 100.000 donne.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità nelle donne è diminuita in modo significativo con andamenti paragonabili in tutte le macro-aree.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità nelle donne ha registrato un andamento in diminuzione di entità paragonabile in tutte le macro-aree, anche se non significativo in ciascuna macro-area considerata singolarmente.

Nella classe di età 50-69 anni, i tassi sono diminuiti significativamente dell'1,2% annuo, mentre nelle donne con almeno 70 anni la riduzione della mortalità osservata di circa l'1,0% annuo non è statisticamente significativa. I tassi di mortalità sono poco variabili tra regioni, eccetto tassi molto alti registrati in Calabria.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	1,0	-1,2	-2,2	-0,2
00-49	2003	2014	0,1	NON CALCOLABILE		
50-69	2003	2014	1,1	-1,2	-2,3	0,0
70+	2003	2014	4,9	-1,0	-2,4	0,4
NORD-OVEST	2003	2014	1,0	-1,2	-4,5	2,3
NORD-EST	2003	2014	1,0	-0,8	-3,1	1,5
CENTRO	2003	2014	0,9	-1,1	-4,3	2,2
SUD E ISOLE	2003	2014	1,1	-1,3	-3,1	0,5

