

INCIDENZA TUMORI DELLA VESCICA

C67, D09,0, D30,3, D41,4

Contesto

Sono stimate circa 21.500 nuove diagnosi di tumore della vescica per gli uomini nel 2018 (11% di tutti i tumori), al quarto posto dopo i tumori della prostata, colon-retto e polmone.

Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 84 casi ogni 100.000 uomini. I tassi erano in discesa di circa lo 0,9% annuo per tutto il periodo 2003-2014. Nel 2014 si osservavano 77 casi ogni 100.000 uomini.

Commento



A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza negli uomini è diminuita in modo significativo in tutte le macro-aree e più consistentemente nel Centro e nel Nord-Est che erano anche le aree a minor incidenza nel 2003.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente diminuita in tutte le macro-aree. In particolare nel Centro di circa l'1,5%, nel Sud e nelle Isole di circa lo 0,8%, e nel Nord-Ovest di circa lo 0,5% annuo. Nel Nord-Est il decremento ha avuto due fasi: dal 2003 al 2011 una diminuzione di circa lo 0,7% all'anno, seguita da una riduzione di circa il 3,3% annuo fino al 2014. Nel periodo osservato, si è registrata una significativa diminuzione dell'incidenza in tutte le classi d'età. In particolare, negli uomini di età inferiore ai 50 anni, dell' 1,5%, nella classe di età 50-69 dello 0,7% e negli uomini con almeno 70 anni dello 0,9% all'anno. La Campania mostra tassi di incidenza vicini a 100/100.000 uomini, quasi doppi rispetto a Umbria e Provincia di Trento.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	80,3	-0,9	-1,0	-0,7
00-49	2003	2014	4,8	-1,5	-2,0	-0,9
50-69	2003	2014	114,6	-0,7	-0,9	-0,6
70+	2003	2014	348,5	-0,9	-1,2	-0,6
NORD-OVEST	2003	2014	80,1	-0,5	-0,9	0,0
NORD-EST	2003	2011	76,9	-0,7	-1,2	-0,1
NORD-EST	2011	2014	71,1	-3,3	-5,7	-0,8
CENTRO	2003	2014	71,3	-1,5	-2,0	-1,0
SUD E ISOLE	2003	2014	86,6	-0,8	-1,0	-0,7





INCIDENZA TUMORI DELLA VESCICA

C67, D09,0, D30,3, D41,4



Contesto

Sono stimate circa 5.600 nuove diagnosi di tumore del vescica per le donne nel 2018 (3% di tutti i tumori), all'ottavo posto dopo i linfomi non Hodgkin.

Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori sia all'inizio che al termine del periodo di osservazione l'incidenza era di 14 casi ogni 100.000 donne. I tassi sono rimasti stabili per tutto il periodo 2003-2014.

Commento



A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nelle donne è rimasta stabile in tutte le macro-aree.


Confronti

Durante il periodo 2003-2014 non vi sono state variazioni significative dell'incidenza in nessuna macro-area. I tassi d'incidenza sono molto simili nelle diverse macro-aree anche alla fine del periodo di osservazione. Nel periodo osservato, non si sono registrate variazioni significative dell'incidenza in nessuna classe d'età.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	13,9	0,1	-0,2	0,3
00-49	2003	2014	1,4	-1,1	-2,5	0,3
50-69	2003	2014	20,3	0,5	-0,03	1,1
70+	2003	2014	56,9	0,0	-0,4	0,3
NORD-OVEST	2003	2014	14,4	-0,2	-0,4	0,1
NORD-EST	2003	2014	14,9	0,2	-0,4	0,8
CENTRO	2003	2014	13,1	0,3	-0,6	1,2
SUD E ISOLE	2003	2014	12,8	0,3	-0,1	0,7





MORTALITÀ TUMORI DELLA VESCICA

C67, D09,0, D30,3, D41,4



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 4.429 decessi per tumore della vescica (ISTAT), pari al 5% di tutti i tumori, al settimo posto dopo il tumore dello stomaco.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori sia all'inizio che al termine del periodo di osservazione la mortalità era di 21 casi ogni 100.000 uomini. I tassi hanno presentato un andamento in tre fasi: dal 2003 al 2007 un incremento non significativo dello 0,5%, quindi un decremento non significativo del 2,6% fino al 2010 e un incremento significativo dell'1,5% annuo sino al 2014.


L'andamento nell'intero periodo è però sostanzialmente stabile.

Commento



A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità negli uomini è rimasta stabile in tutte le macro aree, nonostante gli andamenti oscillanti osservati nel Nord-Ovest e nel Nord-Est, che meriterebbero di essere approfonditi.


Confronti

Durante il periodo 2003-2014, la mortalità negli uomini ha avuto andamenti simili nel Nord-Ovest e nel Nord-Est dove ad una iniziale riduzione significativa dei tassi, rispettivamente fino al 2012 dell'1,4% e fino al 2010 del 2,5% annuo, segue un periodo di incremento non statisticamente significativo della mortalità del 5,7% e 3,7% all'anno. Nel Centro e nel Sud e nelle Isole l'andamento è stazionario. Nella classe di età 50-69 anni e negli uomini con almeno 70 anni non si sono registrate variazioni statisticamente significative della mortalità nel periodo 2003-2014, anche se sono stati osservati andamenti contrastanti in diversi momenti del periodo osservato.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	20,8	0,0	-0,9	0,9
	2003	2007	21,2	0,5	-0,7	1,7
	2007	2010	20,6	-2,6	-6,2	1,2
	2010	2014	20,4	1,5	0,3	2,7
00-49	2003	2014	0,2	NON CALCOLABILE		
50-69	2003	2011	13,6	-1,2	-2,5	0,1
50-69	2011	2014	13,8	4,1	-1,9	10,5
70+	2003	2007	126,0	0,6	-0,8	2,0
70+	2007	2010	122,2	-2,4	-6,4	1,8
70+	2010	2014	121,1	1,2	0,0	2,5
NORD-OVEST	2003	2012	18,5	-1,4	-2,4	-0,5
NORD-OVEST	2012	2014	18,3	5,7	-3,7	16,2
NORD-EST	2003	2010	18,6	-2,5	-4,5	-0,5
NORD-EST	2010	2014	18,4	3,7	-0,8	8,4
CENTRO	2003	2014	20,9	-0,1	-1,0	0,9
SUD E ISOLE	2003	2014	24,3	0,0	-0,7	0,6





MORTALITÀ TUMORI DELLA VESCICA

C67, D09,0, D30,3, D41,4



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 1.212 decessi per tumore della vescica (ISTAT), pari al 2% di tutti i tumori, al nono posto dopo il tumore renale.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio ed alla fine del periodo di osservazione la mortalità era di 3,5 casi ogni 100.000 donne. I tassi sono rimasti sostanzialmente stabili nell'intero periodo.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità nelle donne è rimasta stabile e di entità paragonabile in tutte le macro-aree ad eccezione del Nord-Est dove si è registrato un aumento dei tassi dal 2008 in poi.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità nelle donne non ha subito variazioni statisticamente significative nelle macro-aree del Nord-Ovest, Centro e Sud e Isole. Nel Nord-Est l'andamento è stato trifasico, con variazioni non significative in incremento nel periodo 2003-2005 e in decremento nel periodo 2005-2008 seguiti da un periodo d'incremento significativo della mortalità di circa il 2,9% all'anno fino al 2014.

Nella classe di età 50-69 anni non si sono registrate variazioni significative di mortalità nel periodo osservato. Nelle almeno 70-enni si è registrata prima una diminuzione significativa dell'1,8% all'anno dal 2003 al 2009, seguita da un incremento significativo dell'1,6% annuo fino al 2014.



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	3,5	-0,2	-0,8 0,5
00-49	2003	2014	0,1	NON CALCOLABILE	
50-69	2003	2014	2,1	0,3	-0,9 1,5
70+	2003	2009	20,7	-1,8	-2,9 -0,6
70+	2009	2014	20,5	1,6	0,1 3,1
NORD-OVEST	2003	2014	3,5	-0,9	-1,9 0,0
NORD-EST	2003	2005	3,8	5,7	-9,3 23,2
NORD-EST	2005	2008	3,6	-7,2	-20,9 8,8
NORD-EST	2008	2014	3,5	2,9	1,1 4,8
CENTRO	2003	2014	3,4	-0,7	-2,5 1,1
SUD E ISOLE	2003	2014	3,4	0,8	-0,1 1,7

