



INCIDENZA TUMORI DELLO STOMACO

C16



Contesto

Sono stimate circa 7.400 nuove diagnosi di tumore dello stomaco per gli uomini nel 2018 (4% di tutti i tumori), all'ottavo posto insieme ai tumori delle alte vie respiratorie e digestive.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 39 casi ogni 100.000 uomini. I tassi erano in discesa per tutto il periodo di osservazione di circa il 2,6% annuo. Nel 2014 si osservavano 30 casi ogni 100.000 uomini.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nei uomini è diminuita in modo significativo, in particolare nelle aree del Paese a maggior incidenza (Nord e Centro).



Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente diminuita in tutte le macro-aree: nel Nord-Ovest di circa 2,7% l'anno, nel Nord-Est e Centro di circa 3,5% l'anno e dell'1,2% nel Sud e nelle Isole. Pertanto, alla fine del periodo di studio, permaneva una differenza tra il Centro-Nord (30-33 casi ogni 100.000) e il Sud e le Isole (25 casi ogni 100.000).

Negli uomini di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono rimasti stabili nel primo periodo e significativamente diminuiti del 5% annuo dal 2007. Nelle classi di età 50-69 anni e negli uomini con almeno 70 anni si è osservata una costante riduzione di circa il 2,7% e del 2,5% annuo per tutto il periodo. L'Umbria mostra tassi (>45/100.000) doppi rispetto a Sicilia e Sardegna.



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	33,9	-2,6	-2,8 -2,4
00-49	2003	2007	2,3	1,3	-3,3 6,2
00-49	2007	2014	2,0	-5,0	-7,1 -2,8
50-69	2003	2014	42,5	-2,7	-3,3 -2,1
70+	2003	2014	156,8	-2,5	-2,7 -2,2
NORD-OVEST	2003	2014	37,6	-2,7	-3,1 -2,3
NORD-EST	2003	2014	36,3	-3,6	-3,9 -3,2
CENTRO	2003	2014	40,7	-3,5	-4,4 -2,6
SUD E ISOLE	2003	2014	26,6	-1,2	-1,5 -0,8





INCIDENZA TUMORI DELLO STOMACO

C16



Contesto

Sono stimate circa 5.300 nuove diagnosi di tumore dello stomaco per le donne nel 2018 (3% di tutti i tumori), al nono posto dopo il tumore della vescica.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 20 casi ogni 100.000 donne. I tassi sono in calo di circa il 2,8% all'anno nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 15 casi ogni 100.000 donne.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nelle donne è diminuita in modo significativo, in particolare nelle aree del Paese a maggior incidenza (Nord e Centro).



Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente diminuita in tutte le macro-aree: nel Nord-Ovest di circa 2,6% l'anno, nel Nord-Est di circa 4,2% l'anno, nel Centro di circa 3,1% l'anno e dell'1,1% nel Sud e nelle Isole. Pertanto, alla fine del periodo di studio, le differenze tra le macro-aree si sono quasi annullate.

Nelle donne di età inferiore ai 50 anni e nella classe di età 50-69 anni, i tassi sono significativamente ridotti del 3,4% e 2,4% annuo in tutto il periodo osservato. Nelle donne con almeno 70 anni si è registrato un andamento bifasico: il primo periodo fino al 2008 è stato caratterizzato da un forte decremento del 4,1% annuo, seguito da un decremento più modesto dell'1,9% annuo fino al 2014.



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI
Totale	2003 2014	17,0	-2,8	-3,0 -2,5
00-49	2003 2014	1,8	-3,4	-5,0 -1,9
50-69	2003 2014	19,8	-2,3	-2,8 -1,7
70+	2003 2008	85,1	-4,1	-4,7 -3,4
70+	2008 2014	72,1	-1,9	-2,5 -1,4
NORD-OVEST	2003 2014	17,9	-2,6	-3,1 -2,2
NORD-EST	2003 2014	18,4	-4,2	-4,6 -3,8
CENTRO	2003 2014	21,0	-3,1	-4,0 -2,2
SUD E ISOLE	2003 2014	13,8	-1,1	-1,7 -0,5





MORTALITÀ TUMORI DELLO STOMACO

C16



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 5.470 decessi per carcinoma dello stomaco (ISTAT), pari al 6% di tutti i tumori, al sesto posto dopo il tumore del pancreas.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 29 casi ogni 100.000 uomini. I tassi diminuiscono in modo significativo del 2,4% annuo nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 23 decessi ogni 100.000 uomini.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità negli uomini è diminuita in modo significativo e questo grazie agli andamenti registrati nelle macro-aree del Centro e del Nord, che avevano un tasso di mortalità più alto all'inizio del periodo di osservazione.



Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità negli uomini è diminuita significativamente nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro rispettivamente del 2,4%, 4,0% e 3,5% all'anno. Nel Sud e nelle Isole si è registrata una diminuzione, non statisticamente significativa, del 3,7% nel periodo 2007-2010. Alla fine del periodo le differenze di mortalità nelle quattro aree sono fortemente ridotte.

Negli uomini di età inferiore ai 50 anni e con almeno 70 anni, i tassi sono diminuiti significativamente del 2,7% e 2,4% annuo per tutto il periodo. La classe di età 50-69 anni ha mostrato un andamento a due fasi: il primo periodo, fino al 2010, è stato caratterizzato da una riduzione del 3,5%. Successivamente i tassi sono rimasti sostanzialmente stabili.



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI
Totale	2003 2014	25,1	-2,4	-2,9 -2,0
00-49	2003 2014	1,1	-2,7	-4,0 -1,5
50-69	2003 2010	27,0	-3,5	-4,5 -2,5
50-69	2010 2014	23,6	-0,1	-2,4 2,3
70+	2003 2014	128,5	-2,4	-2,9 -2,0
NORD-OVEST	2003 2014	27,4	-2,4	-3,0 -1,8
NORD-EST	2003 2014	26,3	-4,0	-4,6 -3,4
CENTRO	2003 2014	31,1	-3,5	-4,3 -2,6
SUD E ISOLE	2003 2007	21,0	1,1	-0,9 3,1
SUD E ISOLE	2007 2010	20,4	-3,7	-9,3 2,2
SUD E ISOLE	2010 2014	19,7	1,6	-0,2 3,4





MORTALITÀ TUMORI DELLO STOMACO

C16



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 3.924 decessi per carcinoma dello stomaco (ISTAT), pari al 5% di tutti i tumori, al quinto posto dopo il tumore del pancreas.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 14 casi ogni 100.000 donne. I tassi diminuiscono in modo significativo del 2,7% annuo nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 11 decessi ogni 100.000 donne.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità nelle donne è diminuita in modo significativo e questo grazie agli andamenti registrati nelle macro-aree del Centro e del Nord, che avevano un tasso di mortalità più alto all'inizio del periodo di osservazione.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità nelle donne è diminuita significativamente nel Nord-Ovest e nel Centro rispettivamente del 2,4% e del 4,7% all'anno. Nel Nord-Est l'andamento in diminuzione è stato caratterizzato da due fasi: fino al 2007 un decremento del 6,7% all'anno e successivamente del 3,8% all'anno. Nel Sud e nelle Isole i tassi di mortalità sono rimasti stabili in tutto il periodo. Alla fine del periodo i tassi di mortalità sono sovrapponibili nelle quattro aree.

Nelle donne di età inferiore ai 50 anni e nella classe di età 50-69 anni, i tassi sono diminuiti significativamente di circa il 3% e 1,6% annuo in tutto il periodo. Nelle donne con almeno 70 anni sino al 2011 si è registrata una diminuzione del 3,7% all'anno, seguita da un periodo di stabilità dei tassi. Emilia Romagna e Toscana mostrano tassi di mortalità pari a circa 15/100 000 donne doppi rispetto a Sardegna, Sicilia, Puglia ma anche Piemonte, Veneto e Liguria.



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI
Totale	2003 2014	12,3	-2,7	-3,1 -2,2
00-49	2003 2014	0,9	-3,0	-4,3 -1,6
50-69	2003 2014	11,4	-1,6	-2,1 -1,0
70+	2003 2011	66,2	-3,7	-4,3 -3,1
70+	2011 2014	56,7	-0,3	-3,1 2,6
NORD-OVEST	2003 2014	12,5	-2,4	-2,9 -1,9
NORD-EST	2003 2007	15,5	-6,7	-9,0 -4,3
NORD-EST	2007 2014	11,7	-3,8	-4,9 -2,6
CENTRO	2003 2014	14,7	-4,7	-5,5 -4,0
SUD E ISOLE	2003 2014	10,6	-0,2	-0,9 0,6

