



INCIDENZA TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

C18-21



Contesto

Sono stimate circa 28.800 nuove diagnosi di tumore del colon-retto per gli uomini nel 2018 (15% di tutti i tumori), al secondo posto dopo il tumore della prostata.

Andamenti


Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 104 casi ogni 100.000 uomini. I tassi erano stazionari dal 2003 al 2007, diminuivano del 4,0% annuo dal 2007 al 2010 e dello 0,7% annuo dal 2010 al 2014. Nel 2014 si osservavano 90 casi ogni 100.000 uomini.

Commento



A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza negli uomini è diminuita in modo significativo. Tuttavia, i tassi sono aumentati nel Sud e nelle Isole. Il ruolo dei fattori determinanti di questo aumento, tra cui l'aumento del sovrappeso, il progressivo abbandono della dieta mediterranea ed il ritardo nell'avvio del programma di screening, dovrebbe essere ulteriormente esplorato.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è diminuita significativamente nel Nord-Ovest, Nord-Est e Centro negli uomini seppure in maniera diversa: nel Nord-Est un picco di incidenza si è verificato nel 2005, seguito da una forte riduzione. Nel Sud e nelle Isole si è registrata invece una tendenza in aumento. Pertanto, alla fine del periodo di studio, le differenze nei tassi di incidenza tra le macro aree erano quasi completamente scomparse. Negli uomini di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono diminuiti significativamente dell'1,6% annuo, nella classe di età 50-69 anni hanno mostrato un andamento a tre fasi: il primo periodo è stato caratterizzato da un significativo aumento annuale del 2,1% fino al 2007, la seconda fase ha mostrato un significativo calo annuale del 6,5%, infine i tassi si sono stabilizzati nel periodo 2010-2014.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	98,0	-1,3	-1,8	-0,9
	2003	2007	104,5	0,1	-0,7	0,8
	2007	2010	98,4	-4,0	-6,0	-1,9
	2010	2014	91,2	-0,7	-1,4	0,0
0-49	2003	2014	6,0	-1,6	-2,1	-1,1
50-69	2003	2007	157,3	2,1	0,3	4,0
50-69	2007	2010	148,6	-6,5	-11,8	-0,9
50-69	2010	2014	133,7	0,0	-1,9	1,9
70+	2003	2014	413,3	-1,6	-1,9	-1,4
NORD-OVEST	2003	2007	120,1	-1,6	-3,1	-0,1
NORD-OVEST	2007	2010	105,6	-6,6	-11,1	-1,8
NORD-OVEST	2010	2014	92,9	-0,9	-2,5	0,7
NORD-EST	2003	2006	113,5	3,5	0,4	6,7
NORD-EST	2006	2010	109,8	-4,2	-7,0	-1,4
NORD-EST	2010	2014	97,6	-1,3	-3,1	0,6
CENTRO	2003	2008	107,5	0,6	-1,1	2,3
CENTRO	2008	2014	97,4	-3,6	-4,8	-2,4
SUD E ISOLE	2003	2014	83,6	0,3	0,0	0,6





INCIDENZA TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

C18-21



Contesto

Sono stimate circa 22.500 nuove diagnosi di tumore del colon-retto per le donne nel 2018 (13% di tutti i tumori), al secondo posto dopo il tumore della mammella.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 64 casi ogni 100.000 donne. I tassi sono in calo di circa l'1% all'anno nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 58 casi ogni 100.000 donne.

Commento


A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nelle donne è diminuita in modo significativo. Tuttavia, i tassi sono aumentati nel Sud e nelle Isole. Il ruolo dei fattori determinanti di questo aumento, tra cui l'aumento del sovrappeso, il progressivo abbandono della dieta mediterranea ed il ritardo nell'avvio del programma di screening, dovrebbe essere ulteriormente esplorato.

Confronti



Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è diminuita significativamente nel Nord-Ovest e nel Nord-Est nelle donne rispettivamente del 2,9% e dello 0,9% all'anno. Nel Centro i tassi sono sostanzialmente stazionari, mentre nel Sud e nelle Isole si osserva l'unico aumento significativo, pari allo 0,5% annuo. Pertanto, alla fine del periodo di studio, le differenze nei tassi di incidenza tra le macro aree sono quasi completamente scomparse.

Nelle donne di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono diminuiti significativamente dell'1,1% annuo, nella classe di età 50-69 anni hanno mostrato un andamento a tre fasi: il primo periodo è stato caratterizzato da andamento in crescita fino al 2006, la seconda fase dal 2006 al 2010 ha mostrato un significativo calo annuale del 3,1%, infine i tassi si sono stabilizzati nel periodo 2010-2014.

Nelle donne con almeno 70 anni è stata registrata una diminuzione significativa dell'incidenza dell'1,0% annuo.



	PERIODO	TASSO	APC	95% CI
Totale	2003 2014	61,5	-1,1	-1,4 -0,8
0-49	2003 2014	6,2	-1,1	-1,7 -0,4
50-69	2003 2006	100,9	1,8	0,0 3,7
50-69	2006 2010	97,9	-3,1	-4,9 -1,3
50-69	2010 2014	90,2	-0,6	-1,7 0,6
70+	2003 2014	241,7	-1,0	-1,3 -0,6
NORD-OVEST	2003 2014	65,3	-2,9	-3,3 -2,5
NORD-EST	2003 2014	63,8	-0,9	-1,5 -0,2
CENTRO	2003 2014	66,2	-0,6	-1,2 0,1
SUD E ISOLE	2003 2014	54,7	0,5	0,2 0,9





MORTALITÀ TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

C18-21



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 10.084 decessi per carcinoma del colon retto (ISTAT), pari all'11% di tutti i tumori, al secondo posto dopo il tumore del polmone.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 41 casi ogni 100.000 uomini. I tassi diminuiscono in modo significativo dello 0,7% annuo nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 39 decessi ogni 100.000 uomini.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità negli uomini è diminuita in modo significativo e questo grazie agli andamenti registrati nel Nord-Est e nel Centro.



Confronti

Durante 2003-2014 la mortalità negli uomini è diminuita significativamente nel Nord-Est e nel Centro rispettivamente del 2,0% e 0,9% all'anno. Nel Nord-Ovest e nel Sud e nelle Isole l'andamento è sostanzialmente stazionario.

Negli uomini di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono diminuiti significativamente dell'1,5% annuo, nella classe di età 50-69 anni hanno mostrato un andamento a tre fasi: il primo e il terzo periodo sono stati caratterizzati da un andamento stabile, mentre si è registrata una diminuzione dei tassi dell'1,9% annuo nel quinquennio 2005-2010. Negli uomini con almeno 70 anni la mortalità è calata dello 0,6% annuo. Il Lazio mostra tassi di mortalità di circa 50/100.000 uomini, oltre 50% più alto rispetto a Puglia e Calabria.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	40,6	-0,7	-1,0	-0,3
0-49	2003	2014	1,4	-1,5	-2,8	-0,2
50-69	2003	2005	42,0	1,7	-2,6	6,2
50-69	2005	2010	40,8	-1,9	-3,2	-0,5
50-69	2010	2014	39,3	0,4	-0,9	1,8
70+	2003	2014	211,6	-0,6	-1,0	-0,2
NORD-OVEST	2003	2014	42,5	-0,5	-1,1	0,1
NORD-EST	2003	2014	42,4	-2,0	-2,4	-1,5
CENTRO	2003	2014	43,1	-0,9	-1,3	-0,6
SUD E ISOLE	2003	2014	36,7	0,3	-0,3	0,9





MORTALITÀ TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

C18-21



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 8.851 decessi per carcinoma del colon retto (ISTAT), pari al 12% di tutti i tumori, al terzo posto dopo il tumore della mammella e del polmone.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 25 casi ogni 100.000 donne. I tassi diminuiscono in modo significativo dello 0,9% annuo nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 23 decessi ogni 100.000 donne.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità nelle donne è diminuita in modo significativo e questo grazie agli andamenti registrati nel Nord e nel Centro.

Confronti

Durante 2003-2014 la mortalità nelle donne è diminuita significativamente nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro rispettivamente dell'1,5%, dell'1,1% e dello 1,0% all'anno. Nel Sud e nelle Isole invece l'andamento è sostanzialmente stabile. Alla fine del periodo di osservazione i tassi di mortalità delle 4 aree convergono.

Nelle donne di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono diminuiti significativamente dell'1,7% annuo, nella classe di età 50-69 anni dell'1,0%, nelle 70enni e oltre dello 0,8%. La differenza tra regioni è meno marcata rispetto ad altre sedi.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	24,1	-0,9	-1,2	-0,6
0-49	2003	2014	1,3	-1,7	-2,7	-0,6
50-69	2003	2014	25,2	-1,0	-1,4	-0,6
70+	2003	2014	121,7	-0,8	-1,2	-0,5
NORD-OVEST	2003	2014	24,8	-1,5	-2,1	-0,9
NORD-EST	2003	2014	24,2	-1,1	-1,5	-0,6
CENTRO	2003	2014	24,4	-1,0	-1,6	-0,3
SUD E ISOLE	2003	2014	23,3	-0,1	-0,5	0,4

