



INCIDENZA TUMORI DEL FEGATO

C22

Contesto

Sono stimate circa 8.900 nuove diagnosi di tumore del fegato per gli uomini nel 2018 (5% di tutti i tumori), al quinto posto insieme ai tumori del rene e delle vie urinarie e dopo il tumore della vescica.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 36 casi ogni 100.000 uomini. I tassi erano in riduzione per tutto il periodo di circa l'1,1% annuo. Nel 2014 si osservavano 32 casi ogni 100.000 uomini.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza negli uomini è diminuita in modo significativo, soprattutto al Sud e nelle Isole dove il fattore di rischio principale è rappresentato dalle epatiti virali croniche. Al Nord, dove circa un terzo dei tumori epatici è riconducibile all'abuso alcolico, la riduzione d'incidenza è stata più contenuta. La correlazione con i progressi terapeutici nelle epatiti virali croniche andrebbe ulteriormente indagata.



Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente diminuita nel Nord-Est, di circa l'1,0% annuo, e nel Nord-Ovest, di circa lo 0,6% l'anno. Un decremento più consistente si è registrato nel Sud e nelle Isole, con una riduzione di circa l'1,9% l'anno. I tassi sono rimasti stabili per tutto il periodo nel Centro, che ha comunque tassi d'incidenza inferiori rispetto alle altre aree anche alla fine del periodo di osservazione.

Negli uomini di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono rimasti stabili sino al 2010 e poi si sono significativamente ridotto di circa il 6,7% l'anno. Un andamento opposto si è registrato nella classe di età 50-69 anni, con tassi in riduzione di circa l'1,4% l'anno fino al 2012 e poi un andamento stabile. Negli uomini con almeno 70 anni i tassi si sono ridotti di circa l'1,1% l'anno in tutto il periodo. La Campania mostra tassi di incidenza di circa 45/100.000 uomini, doppi rispetto alla Toscana.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	33,6	-1,1	-1,3	-0,8
00-49	2003	2010	2,5	0,8	-1,1	2,9
00-49	2010	2014	2,2	-6,7	-11,5	-1,5
50-69	2003	2012	52,7	-1,4	-1,7	-1,1
50-69	2012	2014	50,7	2,2	-1,1	5,5
70+	2003	2014	135,7	-1,1	-1,5	-0,7
NORD-OVEST	2003	2014	37,9	-0,6	-1,1	0,0
NORD-EST	2003	2014	32,8	-1,0	-1,4	-0,6
CENTRO	2003	2014	21,7	0,2	-1,0	1,5
SUD E ISOLE	2003	2014	33,2	-1,9	-2,2	-1,5





INCIDENZA TUMORI DEL FEGATO

C22



Contesto

Sono stimate circa 3.900 nuove diagnosi di tumore del fegato per le donne nel 2018 (5% di tutti i tumori), all'undicesimo posto dopo i tumori dei reni e delle vie urinarie.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 13 casi ogni 100.000 donne. I tassi erano in diminuzione di circa l'1,7% all'anno nell'intero periodo. Nel 2014 si osservavano 11 casi ogni 100.000 donne.


Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nelle donne è diminuita in modo significativo in tutte le macro-aree, sia quelle a maggiore che minore incidenza. La correlazione con i progressi terapeutici nelle epatiti virali croniche andrebbe ulteriormente indagata.



Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente diminuita in tutte le macro-aree: nel Nord-Ovest del 2,1%, nel Centro dell'1,9% e nel Sud e nelle Isole dell'1,4%. Nel Nord-Est i tassi si sono significativamente ridotti fino al 2009 di circa il 2,6% l'anno e successivamente in maniera non significativa dello 0,9%. Alla fine del periodo i tassi risultavano ancora più alti nel Sud e nelle Isole e nel Nord-Ovest rispetto al Centro.

Sia nella classe di età 50-69 anni che nelle donne con almeno 70 anni i tassi si sono significativamente ridotti, rispettivamente di circa l'1,9% e l'1,6% all'anno, per tutto il periodo osservato. Come negli uomini, la Campania mostra tassi di incidenza oltre 50% più alti rispetto alle altre regioni.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	11,8	-1,7	-2,2	-1,2
00-49	2003	2014	0,5	NON CALCOLABILE		
50-69	2003	2014	13,5	-1,9	-2,9	-1,0
70+	2003	2014	58,6	-1,6	-2,1	-1,2
NORD-OVEST	2003	2014	12,8	-2,1	-3,0	-1,2
NORD-EST	2003	2009	10,6	-2,6	-3,6	-1,7
NORDEST	2009	2014	9,6	-0,9	-2,2	0,3
CENTRO	2003	2014	7,9	-1,9	-2,9	-0,9
SUD E ISOLE	2003	2014	13,2	-1,4	-1,8	-1,0





MORTALITÀ TUMORI DEL FEGATO

C22



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 6.351 decessi per tumori del fegato (ISTAT), pari al 7% di tutti i tumori, al quarto posto dopo il tumore della prostata.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 28 casi ogni 100.000 uomini. I tassi diminuiscono in modo significativo dello 0,6% annuo nell'intero periodo di osservazione. Nel 2014 si osservavano 27 decessi ogni 100.000 uomini.


Commento

Nel periodo osservato, la mortalità negli uomini è diminuita in modo significativo su tutto il territorio nazionale. Tuttavia nell'area a maggior incidenza, Sud ed Isole, la diminuzione di mortalità non è stata confermata negli ultimi due anni osservati nonostante la continua riduzione dell'incidenza.



Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità negli uomini è diminuita significativamente in tutte le macro-aree, di circa lo 0,5% al Nord e dell'1,5% al Centro. Al Sud e nelle Isole un decremento significativo dell'1,1% annuo fino al 2012 è stato seguito da una stazionarietà dei tassi.

Negli uomini di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono diminuiti significativamente di circa il 4,3% annuo solo a partire dal 2006. Nella classe di età 50-69 anni si è invece registrato un decremento significativo del 2,6% annuo fino al 2008, seguito da una stazionarietà del tasso d'incidenza. Negli uomini con almeno 70 anni la mortalità è calata di circa lo 0,6% annuo per tutto il periodo.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	27,5	-0,6	-1,0	-0,3
00-49	2003	2014	1,1	10,8	-2,4	25,7
00-49	2006	2014	1,1	-4,3	-7,0	-1,4
50-69	2003	2008	34,5	-2,6	-3,7	-1,4
50-69	2008	2014	33,1	0,8	-0,1	1,7
70+	2003	2014	131,2	-0,6	-1,1	-0,2
NORD-OVEST	2003	2014	30,7	-0,6	-1,0	-0,1
NORD-EST	2003	2014	26,3	-0,5	-0,8	-0,1
CENTRO	2003	2014	18,7	-1,5	-2,6	-0,5
SUD E ISOLE	2003	2012	28,0	-1,1	-1,6	-0,6
SUD E ISOLE	2012	2014	27,2	1,9	-3,5	7,5





MORTALITÀ TUMORI DEL FEGATO

C22



Contesto

Nel 2015 sono stati osservati decessi per tumori del fegato (ISTAT), pari al 4% di tutti i tumori, al sesto posto dopo il tumore dello stomaco.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione la mortalità era di 12 casi ogni 100.000 donne. I tassi hanno presentato un andamento in due fasi: in diminuzione significativa di circa il 2,3% annuo fino al 2009 e stabili successivamente. Nel 2014 si osservavano 10 decessi ogni 100.000 donne.

Commento


A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità nelle donne è diminuita in modo significativo, anche se non significativamente nel Nord-Est. Alla fine del periodo il tasso di mortalità nel Sud e nelle Isole rimane più alto rispetto alle altre macro-aree.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità nelle donne è diminuita significativamente in tutte le macro-aree ad eccezione del Nord-Est. In particolare nel Centro e Sud e Isole si è ridotta rispettivamente di circa il 2,5% e l'1,3% l'anno in tutto il periodo osservato. Nel Nord-Ovest invece la riduzione ha avuto due fasi: sino al 2006 di circa il 4,0% l'anno e successivamente dell'1,3%. Nel Nord-Est la riduzione dello 0,8% annuo osservata non è significativa.

Nella classe di età 50-69 anni i tassi sono diminuiti significativamente del 3,3% annuo fino al 2010 e poi sono rimasti sostanzialmente stabili. Nelle donne con almeno 70 anni si è osservata una riduzione significativa per tutto il periodo di circa l'1,4% all'anno.

L'Alto Adige è l'unica regione a mostrare aumenti di tassi di mortalità, pur partendo da tassi molto bassi.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	2003	2014	10,5	-1,5	-2,0	-1,1
	2003	2009	10,9	-2,3	-2,9	-1,7
	2009	2014	0,1	-0,6	-1,5	0,3
00-49	2003	2014	0,2	NON CALCOLABILE		
50-69	2003	2010	9,4	-3,3	-4,6	-2,0
50-69	2010	2014	8,7	2,0	-1,2	5,4
70+	2003	2014	57,7	-1,4	-1,7	-1,0
NORD-OVEST	2003	2006	11,8	-4,0	-6,1	-2,0
NORD-OVEST	2006	2014	10,5	-1,3	-1,9	-0,8
NORD-EST	2003	2014	8,8	-0,8	-2,0	0,4
CENTRO	2003	2014	7,4	-2,5	-4,0	-1,0
SUD E ISOLE	2003	2014	12,3	-1,3	-1,9	-0,7

