

INCIDENZA
TUMORI DEL RENE
E DELLE VIE URINARIE

C64-C66,68

Uomini

Contesto

Sono stimate circa 8.900 nuove diagnosi di tumore dei reni e vie urinarie per gli uomini nel 2018 (5% di tutti i tumori), al quinto posto insieme al tumore del fegato e dopo il tumore della vescica.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio ed alla fine del periodo di osservazione l'incidenza era di 27 casi ogni 100.000 uomini. I tassi d'incidenza sono rimasti stabili per tutto il periodo 2003-2014.

Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nei uomini è rimasta stabile. Tuttavia, i tassi si sono lievemente ridotti nel Nord-Ovest ed aumentati nel Nord-Est.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è significativamente diminuita solo nel Nord-Ovest, di circa lo 0,4% all'anno. Nel Nord-Est si è registrato un incremento significativo del 3,4% annuo dal 2003 al 2006, seguito da una riduzione non significativa dello 0,5% annuo fino al 2014. Nel Centro e nel Sud e nelle Isole i tassi non hanno subito variazioni significative nel periodo osservato. Nel periodo osservato, non si sono registrate variazioni significative d'incidenza in nessuna delle tre classi d'età analizzate.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	**2003**	**2014**	**27,3**	**0,0**	**-0,2**	**0,2**
00-49	2003	2014	4,1	0,3	-0,4	0,9
50-69	2003	2014	46,8	0,0	-0,2	0,3
70+	2003	2014	93,4	-0,1	-0,5	0,4
NORD-OVEST	2003	2014	31,1	-0,4	-0,7	0,0
NORD-EST	2003	2006	32,3	3,4	0,0	6,8
NORD-EST	2006	2014	33,3	-0,5	-1,1	0,2
CENTRO	2003	2014	31,6	0,5	-0,5	1,5
SUD E ISOLE	2003	2014	18,4	0,0	-0,4	0,5







INCIDENZA
TUMORI DEL RENE
E DELLE VIE URINARIE

C64-C66,68

Donne

Contesto

Sono stimate circa 4.500 nuove diagnosi di tumore dei reni e vie urinarie per le donne nel 2018 (3% di tutti i tumori), al decimo posto dopo il tumore dello stomaco.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio del periodo di osservazione l'incidenza era di 11 casi ogni 100.000 donne.
I tassi non hanno subito variazioni significative nel periodo 2003-2014. Nel 2014 si osservavano 12 casi ogni 100.000 donne.

Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 l'incidenza nelle donne è rimasta stabile.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 l'incidenza è rimasta stabile in tutte le macro-aree. In nessuna classe d'età si sono registrate variazioni statisticamente significative dell'incidenza nel periodo osservato, anche se nelle donne con età inferiore ai 50 anni si è registrato un decremento non significativo di circa lo 0,9% annuo.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	**2003**	**2014**	**11,5**	**0,1**	**-0,2**	**0,5**
00-49	2003	2014	2,0	-0,9	-2,3	0,4
50-69	2003	2014	18,4	0,2	-0,2	0,5
70+	2003	2014	40,9	0,4	-0,2	1,0
NORD-OVEST	2003	2014	12,7	0,0	-0,5	0,5
NORD-EST	2003	2014	14,2	0,5	-0,2	1,2
CENTRO	2003	2014	12,7	-0,3	-1,8	1,2
SUD E ISOLE	2003	2014	8,0	0,3	-0,3	0,9







MORTALITÀ
TUMORI DEL RENE
E DELLE VIE URINARIE

C64-C66,68

Uomini

Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 2.237 decessi per tumori dei reni e vie urinarie (ISTAT), pari al 2% di tutti i tumori, al decimo posto dopo i linfomi.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori sia all'inizio che alla fine del periodo di osservazione la mortalità era di 10 casi ogni 100.000 uomini. I tassi non hanno subito variazioni signfiicative nell'intero periodo osservato.

Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014, la mortalità negli uomini è rimasta stabile in tutte le macro-aree.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità negli uomini è rimasta stabile nel Nord-Ovest, Nord-Est e Centro. Nel Sud e nelle Isole si è registrato un aumento significativo di circa il 2,6% annuo dal 2003 al 2010, seguito da un decremento non significativo di circa il 2,5% annuo sino al 2014. Pertanto i tassi di mortalità in tutte le macro-aree risultano invariati alla fine del periodo. Negli uomini di età inferiore ai 50 anni, i tassi sono aumentati di circa il 5,3% all'anno in maniera non statisticamente significativa dal 2003 al 2009 e poi diminuiti significativamente di circa il 7,1% annuo fino al 2014. Nella classe di età 50-69 e negli uomini con almeno 70 anni la mortalità è rimasta stabile nel periodo osservato.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	**2003**	**2014**	**10,4**	**0,1**	**-0,3**	**0,5**
00-49	2003	2009	0,5	5,3	-0,2	11,0
00-49	2009	2014	0,5	-7,1	-13,5	-0,2
50-69	2003	2014	11,7	0,0	-0,6	0,6
70+	2003	2014	51,6	0,1	-0,5	0,8
NORD-OVEST	2003	2014	11,8	0,2	-0,3	0,7
NORD-EST	2003	2014	12,4	-0,7	-1,6	0,3
CENTRO	2003	2014	10,9	-0,2	-1,1	0,7
SUD E ISOLE	2003	2010	7,6	2,6	1,3	4,0
SUD E ISOLE	2010	2014	7,9	-2,5	-5,3	0,4







MORTALITÀ
TUMORI DEL RENE
E DI ALTRI ORGANI URINARI

C64-C66,68

Donne

Contesto

Nel 2015 sono stati osservati 1.224 decessi tumori dei reni e vie urinarie (ISTAT), pari al 2% di tutti i tumori, all'ottavo posto dopo i linfomi.

Andamenti

Nell'insieme dei Registri Tumori all'inizio ed alla fine del periodo di osservazione la mortalità era di 4 casi ogni 100.000 donne.
I tassi non hanno subito variazioni significative in tutto il periodo.

Commento

A livello nazionale, dal 2003 al 2014 la mortalità nelle donne è rimasta stabile in tutte le macro-aree.

Confronti

Durante il periodo 2003-2014 la mortalità nelle donne è rimasta stabile in tutte le macro-aree. L'unica regione con una variazione significativa del tasso di mortalità è la Calabria, con una riduzione di circa il 3,0% annuo. Nel periodo osservato non si sono registrate variazioni significative di mortalità in nessuna classe d'età.



	PERIODO		TASSO	APC	95% CI	
Totale	**2003**	**2014**	**3,8**	**-0,1**	**-0,7**	**0,5**
00-49	2003	2014	0,2	NON CALCOLABILE		
50-69	2003	2014	3,9	-0,1	-1,1	1,0
70+	2003	2014	19,3	0,2	-0,5	0,9
NORD-OVEST	2003	2014	4,3	-0,4	-1,1	0,3
NORD-EST	2003	2014	4,3	-0,4	-1,4	0,7
CENTRO	2003	2014	3,9	0,5	-2,5	3,7
SUD E ISOLE	2003	2014	2,8	0,3	-0,8	1,5